

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Câu 1: Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại theo thứ tự:

- A. đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
- B. đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
- C. đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
- D. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh và đại Tân sinh.

Câu 2: Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng bình thường là $2n$. Trong tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm, bộ nhiễm sắc thể là

- A. $2n - 2$.
- B. $2n + 2$.
- C. $2n + 1$.
- D. $2n - 1$.

Câu 3: Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lí thuyết thì tỉ lệ thể đồng hợp (AA và aa) trong quần thể là

- A. $1/5$.
- B. $(1/2)^5$.
- C. $(1/4)^5$.
- D. $1 - (1/2)^5$.

Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn

- A. người cổ.
- B. vượn người hoá thạch.
- C. người hiện đại.
- D. người vượn.

Câu 5: Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo

- A. từ giai đoạn vượn người hoá thạch trở đi.
- B. từ giai đoạn người tối cổ trở đi.
- C. từ giai đoạn người cổ trở đi.
- D. trong giai đoạn vượn người hoá thạch.

Câu 6: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể $2n = 14$. Dự đoán số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của thể tứ bội ($4n$) ở loài này là

- A. 18.
- B. 24.
- C. 56.
- D. 28.

Câu 7: Trường hợp nào sau đây là thích nghi kiểu hình?

- A. Con tắc kẻ hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo nền môi trường.
- B. Con bọ lá có cánh giống lá cây.
- C. Một loài sâu ăn lá có màu xanh lục ngay từ khi mới sinh ra.
- D. Con bọ que có thân và các chi giống cái que.

Câu 8: Dạng đột biến nào sau đây **không** làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen (đột biến không liên quan đến bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc)?

- A. Mất một số cặp nuclêôtit.
- B. Mất một cặp nuclêôtit.
- C. Thêm một cặp nuclêôtit.
- D. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.

Câu 9: Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hydrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng

- A. thêm một cặp A - T.
- B. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.
- C. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.
- D. mất một cặp A - T.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là **không** đúng khi nói về các cơ chế cách li?

- A. Sự cách li ngăn ngừa giao phối tự do nhờ đó củng cố, tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể gốc.
- B. Cách li địa lí và cách li sinh thái kéo dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và cách li di truyền, đánh dấu sự xuất hiện của loài mới.
- C. Có các dạng cách li: cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền.
- D. Các cơ chế cách li là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá.

Câu 22: Dạng đột biến nào sau đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

- A. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
- B. Đảo vị trí một cặp nuclêôtit.
- C. Thêm một cặp nuclêôtit.
- D. Mất một cặp nuclêôtit.

Câu 23: Trong chọn giống vật nuôi, để củng cố một đặc tính mong muốn nào đó, người ta dùng phương pháp

- A. giao phối cận huyết.
- B. lai khác loài.
- C. lai khác dòng.
- D. lai khác thứ.

Câu 24: Tiến hóa lớn là quá trình hình thành

- A. các nhóm phân loại trên loài.
- B. loài mới.
- C. nòi mới.
- D. các cá thể thích nghi nhất.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về thường biến?

A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.

- B. Thường biến là loại biến dị không di truyền qua sinh sản hữu tính.
- C. Thường biến là loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính.
- D. Thường biến là loại biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định.

Câu 26: Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả màu vàng. Cây tứ bội (4n) thuần chủng quả màu đỏ giao phấn với cây tứ bội quả màu vàng, F₁ thu được toàn cây quả đỏ. (Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ và F₁ xảy ra bình thường). Cho các cây F₁ giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F₂ là

- A. 1 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
- B. 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
- C. 3 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.
- D. 11 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng.

Câu 27: Theo Kimura, nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa ở cấp độ phân tử là

- A. quá trình tích lũy các đột biến có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
- B. sự đào thải các đột biến có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
- C. sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
- D. sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

Câu 28: Một trong các cơ chế gây đột biến của tia tử ngoại là

- A. kích thích nhưng không gây iôn hoá các nguyên tử.
- B. kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc, làm cho nhiễm sắc thể không phân li.
- C. không kích thích nhưng gây ion hóa các nguyên tử.
- D. kích thích và gây iôn hóa các nguyên tử.

Câu 29: Ở ruồi giấm, phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng mắt đỏ kém một axit amin và có hai axit amin mới. Những biến đổi xảy ra trong gen qui định mắt đỏ là

- A. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong ba bộ ba mã hoá kế tiếp nhau.
- B. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hoá kế tiếp nhau.
- C. mất 3 cặp nuclêôtit nằm gọn trong một bộ ba mã hoá.
- D. mất 2 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hoá kế tiếp nhau.

Câu 30: Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n.
- B. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là $2n + 2$.
- C. Những giống cây ăn quả không hạt thường là thể đa bội lẻ.
- D. Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.

Câu 31: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là:

- A. A = 0,4; a = 0,6.
- B. A = 0,2; a = 0,8.
- C. A = 0,8; a = 0,2.
- D. A = 0,3; a = 0,7.

- Câu 32:** Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là
- sự phát triển của cây hạt trần và bò sát.
 - sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ.
 - sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài thực vật và động vật.
 - sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú.
- Câu 33:** Phát biểu nào dưới đây là **sai** khi nói về trẻ đồng sinh?
- Trẻ đồng sinh cùng trứng giống nhau về kiểu gen.
 - Trẻ đồng sinh cùng trứng luôn luôn cùng giới tính.
 - Trẻ đồng sinh khác trứng được sinh ra từ một hợp tử.
 - Trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác giới tính hoặc cùng giới tính.
- Câu 34:** Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở
- thế hệ F_1 .
 - thế hệ F_2 .
 - thế hệ F_3 .
 - tất cả các thế hệ.
- Câu 35:** Lai xa là phép lai giữa
- các dạng bố mẹ thuộc hai giống thuần chủng khác nhau.
 - các dạng bố mẹ thuộc hai loài khác nhau hoặc thuộc các chi, các họ khác nhau.
 - một giống cao sản với một giống địa phương có năng suất thấp thuộc cùng một loài.
 - hai hoặc nhiều thứ có nguồn gen khác nhau.
- Câu 36:** Theo quan niệm hiện đại, nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là
- thường biến và biến dị xác định.
 - đột biến và biến dị tổ hợp.
 - biến dị xác định.
 - thường biến.
- Câu 37:** Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống trên Quả Đất, trong giai đoạn tiến hoá hoá học có sự
- tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức sinh học.
 - hình thành các cơ thể sống đầu tiên từ các chất hữu cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
 - hình thành mầm sống đầu tiên từ chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
 - tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hoá học.
- Câu 38:** Quan niệm nào sau đây có trong học thuyết của Lamac?
- chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
 - Biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản ở từng cá thể riêng lẻ theo những hướng không xác định là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá.
 - Những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ.
 - Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
- Câu 39:** Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
- trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
 - chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
 - không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc kiểu gen.
 - tạo ra các biến dị tổ hợp.
- Câu 40:** Trong giảm phân hình thành giao tử, nếu phát sinh đột biến gen thì tên gọi dạng đột biến đó là
- đột biến xôma.
 - đột biến xôma và đột biến tiền phôi.
 - đột biến giao tử.
 - đột biến tiền phôi.

----- HẾT -----