

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

**PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (33 câu, từ câu 1 đến câu 33).**

**Câu 1:** Cho biết một gen quy định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen

- A. đồng hợp lặn. B. dị hợp.  
C. đồng hợp trội. D. đồng hợp trội và dị hợp.

**Câu 2:** Hiện tượng loài cá ép sống bám vào cá mập và được cá mập mang đi xa, nhờ đó quá trình hô hấp của cá ép trở nên thuận lợi hơn và khả năng kiếm mồi cũng tăng lên, còn cá mập không được lợi nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây là một ví dụ về mối quan hệ

- A. cạnh tranh. B. hợp tác. C. cộng sinh. D. hội sinh.

**Câu 3:** Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu chủ yếu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự

- A. sai khác nhỏ về hình thái. B. cách li địa lí.  
C. cách li sinh sản với quần thể gốc. D. xuất hiện các dạng trung gian.

**Câu 4:** Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

- A. Động vật ăn thịt. B. Động vật ăn thực vật.  
C. Cây xanh. D. Nấm.

**Câu 5:** Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là

- A. tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể.  
B. số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích.  
C. số lượng cá thể có trong quần thể.  
D. tỉ lệ đực và cái trong quần thể.

**Câu 6:** Phát biểu nào sau đây là đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại?

- A. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở cấp độ cá thể, không tác động ở cấp độ quần thể.  
B. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên từng gen riêng rẽ, không tác động tới toàn bộ kiểu gen.  
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp đến kiểu gen và alen của các cá thể trong quần thể.  
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của các cá thể trong quần thể.

**Câu 7:** Trong các mối quan hệ sinh học giữa các loài sau đây, quan hệ nào là kiểu quan hệ cạnh tranh?

- A. Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn. B. Lúa và cỏ dại trong cùng một ruộng lúa.  
C. Mối và trùng roi sống trong ruột mối. D. Chim ăn sâu và sâu ăn lá.

**Câu 8:** Đặc điểm nào dưới đây là một trong các bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người?

- A. Giai đoạn phôi sớm của người có lông mao phủ toàn thân và có đuôi.  
B. Người biết chế tạo công cụ lao động.  
C. Người có tiếng nói và chữ viết.  
D. Người đi bằng hai chân.

**Câu 9:** Một số cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối với nhau (liên rễ). Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ

- A. hỗ trợ khác loài. B. cạnh tranh cùng loài.  
C. cộng sinh. D. hỗ trợ cùng loài.

**Câu 10:** Có thể phát hiện hội chứng 3X ở người bằng phương pháp

- A. nghiên cứu phả hệ. B. nghiên cứu tế bào (di truyền tế bào).  
C. nghiên cứu người đồng sinh cùng trứng. D. nghiên cứu người đồng sinh khác trứng.

**Câu 11:** Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, kiểu gen nào sau đây có thể tạo ra loại giao tử aa với tỉ lệ 50%?

- A. AAAa.                      B. aaaa.                      C. AAaa.                      D. Aaaa.

**Câu 12:** Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?

- A. Rừng trồng.                      B. Rừng mưa nhiệt đới.  
C. Đồng ruộng.                      D. Hồ nuôi cá.

**Câu 13:** Enzim xúc tác cho quá trình tổng hợp ARN là

- A. ADN pôlimeraza.                      B. ARN pôlimeraza.                      C. ligaza.                      D. amilaza.

**Câu 14:** Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tự nhân đôi của ADN (tái bản ADN)?

A. Sau một lần tự nhân đôi, từ một phân tử ADN hình thành nên 2 phân tử ADN giống nhau, trong đó 1 phân tử ADN có hai mạch được tổng hợp mới hoàn toàn.

B. Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

C. Mạch ADN mới được tổng hợp liên tục theo chiều 3'-5'.

D. Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra trong tế bào ở kì giữa của quá trình phân bào.

**Câu 15:** Ở một loài thực vật, lai dòng cây thuần chủng có hoa màu đỏ với dòng cây thuần chủng có hoa màu trắng thu được F<sub>1</sub> đều có hoa màu đỏ. Cho F<sub>1</sub> tự thụ phấn, thu được F<sub>2</sub> phân li theo tỉ lệ: 9 hoa màu đỏ : 7 hoa màu trắng. Biết không có đột biến mới xảy ra. Màu sắc hoa có thể bị chi phối bởi quy luật

A. di truyền liên kết với giới tính.

B. tác động đa hiệu của gen.

C. phân li.

D. tương tác bổ sung (tương tác giữa các gen không alen).

**Câu 16:** Trong chuỗi thức ăn trên cạn khởi đầu bằng cây xanh, mắt xích có sinh khối lớn nhất là sinh vật

- A. tiêu thụ bậc một.                      B. tiêu thụ bậc hai.                      C. sản xuất.                      D. tiêu thụ bậc ba.

**Câu 17:** Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzym amilaza là

- A. mất đoạn.                      B. lặp đoạn.                      C. đảo đoạn.                      D. chuyển đoạn.

**Câu 18:** Trong 4 loại đơn phân của ADN, hai loại đơn phân có kích thước nhỏ là

- A. Adênin và Timin.                      B. Guanin và Adênin.                      C. Xitôzin và Adênin.                      D. Timin và Xitôzin.

**Câu 19:** Nhân tố **không** làm thay đổi tần số alen trong quần thể giao phối là

A. đột biến.

B. giao phối ngẫu nhiên.

C. yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền).

D. di nhập gen (du nhập gen).

**Câu 20:** Đối với quá trình tiến hoá, đột biến gen có vai trò

A. cùng với chọn lọc tự nhiên làm tăng tần số các alen trội có hại trong quần thể.

B. phát tán đột biến trong quần thể.

C. định hướng quá trình tiến hoá.

D. tạo ra các alen mới.

**Câu 21:** Nhân tố làm phát tán các đột biến trong quần thể giao phối là

A. chọn lọc tự nhiên.

B. yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền).

C. giao phối.

D. các cơ chế cách li.

**Câu 22:** Kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể nào sau đây là kiểu biến động theo chu kì?

A. Số lượng cá thể của quần thể ếch đồng ở miền Bắc Việt Nam tăng nhanh vào mùa hè và giảm vào mùa đông.

B. Số lượng cá thể của quần thể cá chép ở Hồ Tây giảm sau khi thu hoạch.

C. Số lượng cá thể của quần thể thông ở Côn Sơn giảm sau khi khai thác.

D. Số lượng cá thể của quần thể tràm ở rừng U Minh giảm sau khi cháy rừng.

**Câu 23:** Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

A. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

B. làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.

C. phân hoá các nhóm tuổi khác nhau trong quần thể.

D. làm phát sinh các alen mới trong quần thể.



**Câu 37:** Quần thể giao phối nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,01AA : 0,95Aa : 0,04aa.

B. 0,09AA : 0,55Aa : 0,36aa.

C. 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa.

D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa.

**Câu 38:** Trong rừng mưa nhiệt đới, những cây thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm thực vật

A. ưa sáng.

B. chịu bóng.

C. ưa bóng.

D. ưa bóng và chịu hạn.

**Câu 39:** Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường được gọi là

A. đột biến gen.

B. đột biến.

C. thường biến (sự mềm dẻo của kiểu hình).

D. đột biến nhiễm sắc thể.

**Câu 40:** Cho các enzym sau: ARN pôlimeraza, restrictaza, ligaza, ADN pôlimeraza và amilaza.

Các enzym được dùng để cắt và nối ADN của tế bào cho với ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo nên ADN tái tổ hợp là

A. restrictaza và ligaza.

B. ligaza và ADN pôlimeraza.

C. ADN pôlimeraza và amilaza.

D. ARN pôlimeraza và restrictaza.

---

**Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (7 câu, từ câu 41 đến câu 47).**

**Câu 41:** Trong lịch sử phát sinh loài người, loài nào trong các loài dưới đây xuất hiện sớm nhất?

A. *Homo neanderthalensis*.

B. *Homo erectus*.

C. *Homo sapiens*.

D. *Homo habilis*.

**Câu 42:** Trong nhân tế bào sinh dưỡng của một cơ thể sinh vật có hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau, đó là dạng đột biến

A. thể dị đa bội.

B. thể tự đa bội.

C. thể bốn nhiễm.

D. thể lệch bội.

**Câu 43:** Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai Aabb × aaBb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

A. 3 : 1.

B. 9 : 3 : 3 : 1.

C. 1 : 1 : 1 : 1.

D. 1 : 1.

**Câu 44:** Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên.

B. Những con cá sống trong Hồ Tây.

C. Những cây cỏ sống trên đồng cỏ Ba Vì.

D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương.

**Câu 45:** Đột biến là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá vì đột biến là loại biến dị

A. di truyền được.

B. không liên quan đến biến đổi trong kiểu gen.

C. không di truyền được.

D. luôn luôn tạo ra kiểu hình có lợi cho sinh vật.

**Câu 46:** Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái?

A. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không hoàn chỉnh.

B. Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống sinh học không ổn định.

C. Hệ sinh thái tự nhiên bao gồm thành phần vô sinh (môi trường vật lí) và thành phần hữu sinh (quần xã sinh vật).

D. Trong một hệ sinh thái tự nhiên, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng.

**Câu 47:** Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây ở người là do gen đột biến lặn gây nên?

A. Bệnh bạch tạng.

B. Hội chứng Claiphentơ (Klaiphentơ).

C. Hội chứng Tơcnơ.

D. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

----- HẾT -----